

La influenza aviar de alta patogenicidad, o IAAP, es una enfermedad vírica de rápida propagación que puede infectar a muchos tipos de aves. La gripe aviar, a menudo llamada gripe de pájaro, puede ser común, pero algunas cepas son altamente patógenas, lo que significa que son más mortales. Introducida por las aves silvestres que migran, la gripe aviar puede propagarse a través de la migración de primavera y afectar a **todas** las aves de corral domésticas, tanto a las pequeñas bandadas como a las de patio, así como a las industrias comerciales.

Las aves de corral con IAAP **no** sobreviven a la enfermedad. Las vacunas contra la IAAP no son fáciles de conseguir.

- Tos y estornudos
- Dificultad para respirar
- Depresión extrema
- Falta de energía
- Disminución de la ingesta de alimento o agua
- Hinchazón o decoloración púrpura de la cabeza, los párpados, la cresta, el barbillón y las patas
- Disminución de la producción de huevos
- Muerte súbita inexplicable

La bioseguridad es su mejor opción para evitar que la IAAP entre en su manada de aves de corral pequeñas o de traspatio.

Esto es lo que puede hacer:

Proteja su pequeño averío de la gripe aviar

- 1 Evite** atraer las aves silvestres y acuáticas a su casa o granja. Los pájaros cantores, gorriones, estorninos, etc. son de **bajo riesgo**.



Limpie los derrames de pienso. **Reduzca** los charcos y el agua estancada.

Evite visitar estanques y arroyos, especialmente con animales domésticos.

No traslade las aves de una granja a otra.

Aísle a las nuevas aves.

- 2 Limite o interrumpa** los viajes con sus pájaros a las ventas, exposiciones e intercambios.

Asegúrese de tener las manos, la ropa y el calzado limpios antes de manipular sus aves si asiste a eventos. **No** permita que otras personas manipulen sus aves.



- 3 Limite las visitas** de sus aves.

Si alguien tiene que visitar a sus pájaros: discuta dónde ha estado. Haga que se lave las manos y que lleve ropa y calzado limpios.

